

ASSIOLO (*Otus scops*)

- *Corologia*: eurocentroasitica-mediterranea.
- *Fenologia*: Migratore, nidificante scarso e localizzato.
- *Trend*: decremento, stabilità o fluttuazione locale. Scomparsa negli anni '50 e '60 da gran parte della Pianura Padana.
- *SPEC*: 2.
- *Red list*: con minima preoccupazione.
- *Lista rossa nazionale*: a più basso rischio.

| | n. | % |
|----------------------------|----|-------|
| Frequenza (n. U.R.) | 6 | 2,88 |
| Nidificazioni possibili | 6 | 85,71 |
| Nidificazioni probabili | 1 | 14,28 |
| Nidificazioni accertate | 0 | 0 |
| Ambienti | 3 | 12,5 |
| Acquatici | 0 | 0 |
| Alberati | 2 | 28,57 |
| Aperti | 0 | 0 |
| Antropizzati | 1 | 16,66 |

Un tempo lo si rinveniva con facilità sia in ambiente urbano che agricolo, ora invece la sua presenza pare quasi esclusivamente limitata alla fascia boscata del torrente Staffora. Tuttavia è assolutamente necessario indagare maggiormente l'effettiva distribuzione locale della specie, che potrebbe essere stata sottovalutata a causa del numero insufficiente di uscite nelle ore notturne e crepuscolari. Nelle vicinanze di Voghera risulta essere localmente

abbastanza numeroso, come ad esempio presso il Parco "Le Fologhe", a Casei Gerola, che dista pochi chilometri dal confine comunale con Voghera.

Mapa di distribuzione dell'Assiolo.




Figura 2.9 – Sito di nidificazione nel tratto urbano di Staffora. (Francesco Gatti).

