

FALCO DI PALUDE (*Circus aeruginosus*)

- *Corologia*: paleartica-paleotropicale, australasiana.
- *Fenologia*: Migratore regolare, nidificante (?).
- *Trend*: incremento, stabilità o fluttuazione locale.
- *Direttiva Uccelli*: inserita nell'Allegato I.
- *Red list*: con minima preoccupazione.
- *Lista rossa nazionale*: in pericolo.

	n.	%
Frequenza (n. U.R.)	3	1,44
Nidificazioni possibili	3	100
Nidificazioni probabili	0	0
Nidificazioni accertate	0	0
Ambienti	2	8,33
Acquatici	0	0
Alberati	0	0
Aperti	2	40
Antropizzati	0	0

La nidificazione di questa specie è in discussione e sarà opportuno dedicarle, nel corso dell'ultima stagione della ricerca, particolare riguardo per verificarne l'importante eventualità.

Il Falco di palude è infatti specie scarsa quale nidificante in tutta la provincia e meritevole perciò di uno sforzo ulteriore, preferibilmente coordinato, da parte dei rilevatori.

Come raffigurato nella mappa di distribuzione, gli individui oggetto delle

osservazioni sono spesso stati considerati migratori. Tuttavia se è vero che 5 (il 71%) delle 7 osservazioni sono avvenute tra la fine di aprile e la prima decade di maggio, le rimanenti 2 sono rispettivamente relative al 26 maggio ed al 5 giugno, periodo tardo per i migratori. La mancanza di notizie circa l'età degli individui osservati in stagione idonea induce a sospendere momentaneamente un giudizio definitivo sulla specie, in attesa come già detto di nuovi dati a conforto di una o dell'altra tesi.

Mappa di distribuzione del Falco di palude.

