

LODOLAIO (*Falco subbuteo*)

- *Corologia*: olopaleartica.
- *Fenologia*: migratore regolare, nidificante.
- *Trend*: stabilità, fluttuazione locale, incremento ed espansione territoriale in Pianura Padana da metà anni '90.
- *Red list*: con minima preoccupazione
- *Lista rossa nazionale*: vulnerabile

	n.	%
Frequenza (n. U.R.)	17	8,17
Nidificazioni possibili	2	66,66
Nidificazioni probabili	1	33,33
Nidificazioni accertate	0	0
Ambienti	5	20,83
Acquatici	0	0
Alberati	4	57,14
Aperti	1	20
Antropizzati	0	0

Sono state accertate due sole nidificazioni di questa specie, la cui presenza tuttavia è stata segnalata in diverse unità, soprattutto in aree agricole caratterizzate dalla presenza di filari alberati e boschetti ripariali lungo Staffora.

Si ritiene che la scarsità di accertamenti possa essere in parte dovuta al periodo di nidificazione tardo della specie, considerato il limitato numero di rilevamenti nei mesi estivi.

In questo ultimo anno di ricerca sarà perciò opportuno effettuare uscite mirate a luglio ed agosto (mese quest'ultimo in cui sono state accertate le due nidificazioni sopra citate),

così da ottenere un quadro più veritiero circa la nidificazione di questa specie.

Mapa di distribuzione del Lodolaio.

