

PARROCCHETTO DAL COLLARE

(*Psittacula krameri*)

- *Corologia*: paleotropicale.
- *Fenologia*: stanziale (aufugo naturalizzato) e nidificante localizzato.
- *Trend*: naturalizzazione recente, incremento di espansione di areale.
- *Red list*: con minima preoccupazione.

| | n. | % |
|----------------------------|----|-------|
| Frequenza (n. U.R.) | 10 | 4,8 |
| Nidificazioni possibili | 6 | 35,29 |
| Nidificazioni probabili | 7 | 41,17 |
| Nidificazioni accertate | 4 | 23,52 |
| Ambienti | 5 | 20,83 |
| Acquatici | 1 | 16,66 |
| Alberati | 2 | 28,57 |
| Aperti | 0 | 0 |
| Antropizzati | 2 | 33,33 |

A Voghera il Parrocchetto dal collare nidifica esclusivamente lungo la fascia boscata dello Staffora, nel tratto urbano ed in quello meridionale. Per la nidificazione utilizza esclusivamente nidi scavati da *Picus viridis*, contrariamente a quanto accade a Pavia, sito di nidificazione più vicino a quello vogherese, dove invece utilizza le cavità di alcuni edifici storici. Presente tutto l'anno; in inverno tende a recarsi in città alla ricerca di cibo.

Mappa di distribuzione del Parrocchetto dal collare.




Figura 2.8 – Maschio adulto mentre ispeziona un nido di Picchio verde scavato in un Pioppo bianco lungo il tratto urbano di Staffora. (Francesco Gatti).

